

ก้าวข้ามมิติ



การปลูกมันสำปะหลังแบบเต็มๆ

เพื่อก้าวเข้าสู่...มิติใหม่ โดยใช้ **“นวัตกรรมการเพาะปลูกยุคใหม่”**

กับกระบวนการ Tuberization

ด้วยโปรแกรม **“วันเดอร์แลนด์ 30 ตัน”** มันเงินล้าน

ดินโปร่งร่วนซุย รากดูดกินปุ๋ยได้ดี
มือออกซิเจนให้ดินเพียงพอ
รากแตกได้มาก ได้หัวมาก หัวใหญ่
ขยายได้หลายสิบกิโลกรัมต่อต้น



ซอส์โลฟี่



กรีนอัฟ

อาหารหลักพร้อม อาหารเสริมเพียง
ฮอร์โมนครบ โรคและแมลงไม่รบกวน
“เม็ดยับ” ทำงานสารพัดประโยชน์
เพียงเติมโตดี แตรราก แตกใบ
แตกคอคติ มีหัวมากน้ำหนักมาก



พาร์ทเวย์

สารตั้งต้น (Starter) ในกระบวนการชีวเคมี
เพื่อการสร้างสมของพืช อาทิ สร้างแป้ง
สร้างน้ำมัน และอื่นๆ เป็นต้น ใช้กับมันสำปะหลัง
จะช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งให้สูงขึ้น มีน้ำหนักดี
หัวใหญ่ เก็บเกี่ยวไวกว่าปกติ



แอคซอน

สารอินทรีย์สังเคราะห์ มีกรดอินทรีย์
ทำหน้าที่ **“สังสงหัว”** (Tuberization)
โดยเพิ่มเส้นทางการเจริญเติบโตทางด้านยาว
(Elongation) มาเป็นทางด้านกว้าง
(Lateral growth) ทำให้ระดับน้ำตาล
ในเซลล์สูงขึ้นในแนวกว้าง และเซลล์
ขยายตัวเพิ่มขึ้นและใหญ่ขึ้น เพิ่มพื้นที่สะสม
แป้งและโปรตีนมากขึ้น ฟันเพียงครั้งเดียว
เท่านั้น ประหยัดแรงงาน



อีเรเซอร์-วัน

สารอินทรีย์ป้องกันโรคแบบเฉียบพลัน และป้องกันเพลี้ยแป้ง
ในระยะเริ่มต้นและวัยอ่อน ไม่ให้ทำลายใบและดิน ชัดเจน
อย่างสม่ำเสมอ ทุก 7-10 วัน

***ที่เด็ดเคล็ดลับ**

อย่า! ปลอ่ยให้

ดินมันสำปะหลังมิ้วแต่หลองงามใบ หลองงามใบ จนไม่ยอมลงหัว

ต้องออกคำสั่งด้วย **AXZON** (สารสังสงหัว) **ฟันเพียงครั้งเดียว**

ไม่มีการเบี้ยว ถึงเวลาต้องลงหัว

ปลอดภัย ไม่มีสารอันตราย ไม่มีสารตกค้าง

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

บริษัท ออร์กานอลไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

สาขากรุงเทพฯ : 99/122 หมู่ 8 ม.ชลลดา (วงแหวนรัตนวิเศษ) ถนนบางโพธิ์-หนองปรือ
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 02-9654089, 084-8809595

สาขาเชียงใหม่ : 221/8 หมู่ 6 ต.ป่าซ่าน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053-246851 แฟกซ์ 053-854035

สาขาสุราษฎร์ธานี : 64/23 ถนนพยุภนทะเล หมู่ 3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร./แฟกซ์ 077-405618

สาขาหาดใหญ่ : 1/12 ถนนวิทยายุทธศึก 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร./แฟกซ์ 074-356855

สาขาขอนแก่น : 301/80-81 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร./แฟกซ์ 043-243221

สำนักงานสาขาชัยนาท : เลขที่ 370 หมู่ 5 ถ.กลางหลวง 340 (ชัยนาท-สุพรรณบุรี) ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.ชัยนาท (ก่อนถึงเทศบาล ไล่ตัส และอยู่เยื้องกับศูนย์วิจัยฯ ชัยนาท) โทร 056-420500

www.organellelife.com

1

ไร่ ปลุก 2,000 ต้น

ต้น ต้องได้น้ำหนัก 15 กิโลกรัม

ไร่ จะได้ผลผลิต 30,000 กิโลกรัม = 30 ต้น

ขั้นตอน 6 ขั้น **“วันเตอร์แลนต์ 30 ต้น”** มั่นสำปะหลังเงินล้าน

ขั้นที่	การปฏิบัติ	
1	ระยะปลุกดี : ได้อากาศดี กินอาหารได้เต็มที่	 ปลูกระยะหว่างต้น x ระยะระหว่างแถว 80 x 100 ซม. 1 ไร่ ปลุกได้ 2,000 ต้น
2	ดินโปร่งร่วนซุย : แตรกรากมาก ได้หัวมาก เพราะราก คือ หัว	 ใส่ “ซอส์ไลฟ์” โดยการผสมน้ำรด หรือฉีดพ่นบนผิวหน้าดินก่อนปลุก หรือระหว่างเตรียมดินหรือเตรียมแปลง อัตราผสม 10-15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ขึ้น) ฉีดพ่นให้ทั่วแปลง จะทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ไม่แน่นแข็ง ระบายอากาศได้ดี รากแตกได้มาก
3	อาหารและฮอร์โมนอย่าให้ขาด ต้องให้จนครบถ้วน	 ใส่ “กรีนอัพ” ในอัตรา ไร่ละ 50 กิโลกรัม โดยการหว่านในร่อง หรือใส่พูน เป็นจุดๆ ระหว่างต้นก็ได้
4	เพิ่มการแตกรากสร้าง Stolon ให้มาก (กระบวนการ Stolonization)	 ฉีดพ่นด้วย “ไบโอ-เร็กซ์” ในอัตรา 10 กรัม (1 ซอง) ต่อน้ำ 1 ขึ้น ทุก 10-15 วัน จนครบ 75 วัน เพื่อกระตุ้นการแตกรากให้มาก และเพิ่มธาตุสังกะสี (Zn)
5	อย่า! ให้ “หลงงามดิน หลงงามใบ” จนไม่ยอมลงหัว ต้องให้ Axzon สลับ (กระบวนการ Turberization)	 เมื่ออายุหลังปลุกได้ 75-90 วัน ควรฉีดพ่นด้วย “AXZON” (แอกซอน) สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่จำเป็นต่อการลงหัว เพื่อ “สั่งลงหัว” โดย AXZON จะบังคับให้ต้นมีน้ำสำปะหลัง เปลี่ยนการเจริญเติบโตทางด้านข้าง (Elongation growth) มาเป็นการเจริญเติบโตด้านกว้าง (Lateral growth) ทำให้ระดับน้ำตาลในเซลล์สูงขึ้นในแนวกว้าง และเซลล์ขยายตัวเพิ่มขึ้น และขยายใหญ่ขึ้น เพิ่มพื้นที่สะสมแป้งและโปรตีนมากขึ้น ฉีดพ่น AXZON เพียงครั้งเดียว เท่านั้น อัตราผสม 20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ขึ้น)
6	โรคและเพลี้ย ต้องป้องกัน (กระบวนการ Immunization)	 ฉีดพ่น “อีโรเซอร์-1” เพื่อป้องกันโรคและเพลี้ย เนื่องจากอีโรเซอร์-1 เป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคทุกชนิดของมันสำปะหลัง และมีผลข้างเคียงในการขับไล่เพลี้ยแป้ง ควรพ่นอย่างสม่ำเสมอ หลังจากเริ่มมีใบเสียงเกิดขึ้น พ่นทุก 7-10 วัน อัตราผสม 20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ขึ้น)
7	“เพิ่มน้ำหนักหัวมันและเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันด้วยสารสะสมแป้ง” (กระบวนการ Starchization)	 ฉีดพ่นด้วย “พาร์กเวย์” สารตั้งต้น (Starter) ในกระบวนการชีวเคมีของพืช ในการสร้างสารสะสมต่างๆ อาทิ แป้ง น้ำตาล น้ำมันในพืชแต่ละชนิด ในมันสำปะหลัง ถ้าต้องการเพิ่ม % แป้งให้สูงขึ้น ควรฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน จนกระทั่งเก็บเกี่ยว จะทำให้การเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นอีก 1-2 เดือน อัตราผสม 20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ขึ้น)



ปลุก มันสำปะหลัง ยุคใหม่

อย่า! ปล่อยึดดินมันสำปะหลังมือแล้ว...

“หลงงามดิน หลงงามใบ” จนไม่ยอมลงหัว
ต้องออก **“คำสั่ง”** ด้วย **AXZON (แอกซอน)**



ไม่ได้ใช้
Axzon



ใช้
Axzon

ฉีดพ่นอายุ 90 วัน

ภาพถ่ายหลังฉีดพ่น
25 วัน (มันอายุได้
3 เดือน 25 วัน)

นวัตกรรมใหม่สำหรับพืชมีหัวด้วยกระบวนการ Tuberization และ Starchization สำหรับ มันฝรั่ง มันสำปะหลัง เผือก ทอม กระเทียม และพืชลงหัวทุกชนิด

มีส่วนผสมของกรดอินทรีย์ที่ส่งเสริมกระบวนการลงหัวให้พืช (Tuberization) AXZON ทำให้พืชเปลี่ยนการเจริญเติบโตทางด้านยาว (Elongation growth) มาเป็นการเจริญเติบโตทางด้านกว้าง (Lateral growth) แทนโดย AXZON จะทำให้ระดับน้ำตาลในเซลล์สูงขึ้นทำให้เกิดการแบ่งเซลล์ในแนวรัศมีของลำต้นมากขึ้นเซลล์ขยายตัวมีขนาดใหญ่มากขึ้น ทำให้มีพื้นที่พร้อมที่จะสะสมแป้งและโปรตีนมากขึ้น AXZON ประกอบด้วยสารเคมี ที่โดยปกติพืชลงหัวต้องสร้างขึ้นตามธรรมชาติในช่วงระหว่างเริ่มลงหัว AXZON จึงสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องมีส่วนผสมของสารเคมีที่อันตรายไม่คุ้มค่าในผลผลิต

